

Acutil®

Doplňěk stravy

CO JE ACUTIL®

ACUTIL® je doplňěk stravy, který obsahuje:

	V jedné kapsli	
Rybí olej	500 mg	--
Omega-3 mastné kyseliny	350 mg	--
DHA – Kyselina dokosahexaenová	250 mg	--
EPA – Kyselina eikosapentaenová	40 mg	--
Extrakt z listů Ginkgo biloba 24/6%	60 mg	--
Fosfatidylserin	15 mg	--
Vitamín E (d- α -tokoferol)	5 mg	42 %*)
Kyselina listová (folát)	250 μ g	125 %*)
Vitamín B12	5 μ g	200 %*)

*) Referenční hodnota příjmu (RHP)

Složení: **rybí olej** s omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami, obal kapsle (hovězí želatina, zvlhčující látka - glycerol, sorbitol, barvivo - žlutý a červený oxid železitý), extrakt z listů Ginkgo biloba 24/6%, emulgátor - mono- a diglyceridy mastných kyselin, fosfatidylserin (obsahuje **sóju**), vitamín E (d- α -tokoferol), vitamín B12 a kyselina listová. Obsažené alergeny jsou uvedeny **tučně**.

ACUTIL® je doplňěk stravy obsahující nejen omega-3 nenasycené mastné kyseliny, ale i výtažek z listů Ginkgo biloba, fosfatidylserin, kyselinu listovou a vitamíny E a B12.

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny DHA i EPA jsou součástí buněčných membrán nervových buněk, tedy neuronů, které jsou nezbytné pro přenos informací v mozku. DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku. Množství DHA v jedné kapsli Acutilu® (250 mg) je dostatečné k dosažení příznivého účinku.

Vitamín B12 přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje metabolismus homocysteinu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Zvýšení odbourávání homocysteinu snižuje jeho možné toxické působení na mozek.

Kyselina listová přispívá k normální psychické činnosti a podobně jako vitamin B12 pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání.

Vitamín E přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Oxidativní stres vede k tvorbě volných kyslíkových radikálů, které mohou poškodit nervové buňky.

Složky standardizovaného extraktu **Ginkgo biloba** přispívají ke správnému prokrvení mozku.

Fosfatidylserin je složkou buněčných membrán nervové a mozkové tkáně.

JAK UŽÍVAT ACUTIL®?

Doporučená denní dávka přípravku ACUTIL® je 1 kapsle během jídla nebo po jídle, zapijte nealkoholickým nápojem.

ACUTIL® je vhodný k dlouhodobému užívání.

Doplňky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

UPOZORNĚNÍ

Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání:

- pacientům před plánovanou operací
- těhotným nebo kojícím ženám
- pacientům užívajícím antikoagulantia či antiagregancia
- diabetikům

Může snižovat srážlivost krve.

Není určeno k podávání dětem.

Uchovávejte při pokojové teplotě (do 25 °C), nevystavujte zdrojům tepla a přímému slunečnímu záření.

Datum minimální trvanlivosti se vztahuje k řádně uchovávanému přípravku v nepoškozeném obalu.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Vyrobeno ve:

Wassen International Ltd.

Jménem:

A.C.R.A.F. S.p.A

Viale Amelia 70

Rome, Itálie

Distributor:

Angelini Pharma Česká republika s.r.o.

Palachovo náměstí 799/5, 625 00 Brno

www.angelini.cz

BALENÍ

Balení obsahuje 30 nebo 60 kapslí.

L/169/09/J

Datum poslední revize textu: listopad 2020