

## Příbalová informace

**Acutil**  
doplňěk stravy

**CO JE ACUTIL®**

ACUTIL je doplňěk stravy, který v každé kapsli obsahuje:

	V 1 kapsli		Ve 2 kapslích
Rybí olej	500 mg	-	1000 mg
Omega-3 mastné kyseliny	350 mg	-	700 mg
DHA-Kyselina dokosahexaenová	250 mg	-	500 mg
EPA-Kyselina eikosapentaenová	40 mg	-	80 mg
Extrakt z Ginkgo biloba	60 mg	-	120 mg
Fosfatidylserin	15 mg	-	30 mg
Vitamín E (d-alfa-tokoferol)	5 mg	42%*)	10 mg
Kyselina listová (folát)	250 µg	125%*)	500 µg
Vitamín B12	5 µg	200%*)	10 µg

\*) doporučené denní dávky (DDD)

### SLOŽENÍ:

Rybí olej bohatý na omega-3 nenasycené mastné kyseliny: kyselina dokosahexaenová (DHA) a kyselina eikosapentaenová (EPA); extrakt z Ginkgo biloba, fosfatidylserin, vitamín E (jako d-alfa-tokoferol), kyselina listová a vitamín B12.

**Složky kapsle:** želatina, glycerol, glyceryl monostearát (stabilizátor), sorbitol, oxid železitý červený (barvivo), oxid železitý žlutý (barvivo). ACUTIL je doplňěk stravy obsahující nejen omega-3 nenasycené mastné kyseliny, ale i výtažek z Ginkgo biloba, fosfatidylserin, kyselinu listovou a vitamíny E a B12.

**Omega-3** nenasycené mastné kyseliny DHA i EPA jsou součástí buněčných membrán nervových buněk, tedy neuronů, které jsou nezbytné pro přenos informací v mozku. DHA přispívá k udržení normální činnosti mozku. Množství DHA v jedné kapsli Acutilu (250 mg) je dostatečné k dosažení příznivého účinku.

**Vitamín B12** přispívá k normální činnosti nervové soustavy, podporuje metabolismus homocysteinu a přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání. Zvýšení odbourávání homocysteinu snižuje jeho možné toxické působení na mozek.

**Kyselina listová** přispívá k normální psychické činnosti a podobně jako vitamín B12 pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání.

**Vitamín E** přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem. Oxidativní stres vede k tvorbě volných kyslíkových radikálů, které mohou poškodit nervové buňky.

Složky standardizovaného extraktu **Ginkgo biloba** (min. 24% flavonoidů, min. 6 % terpenoidů) přispívají ke správnému prokrvení mozku.

**Fosfatidylserin** je složkou buněčných membrán nervové a mozkové tkáně.

### JAK UŽÍVAT ACUTIL?

Doporučená denní dávka přípravku ACUTIL je 1-2 kapsle během jídla nebo po jídle, zapijte

nealkoholickým nápojem. Jestliže užíváte tento přípravek poprvé, užívejte 2 kapsle denně po dobu 12 týdnů. ACUTIL je vhodný k dlouhodobému užívání. Doplnky stravy nejsou náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Nepřekračujte doporučené denní dávkování.

## **VAROVÁNÍ**

Bez konzultace s lékařem či lékárníkem se nedoporučuje k užívání:

- pacientům před plánovanou operací
- těhotným nebo kojícím ženám
- pacientům užívajícím antikoagulancia či antiagregancia
- diabetikům

ACUTIL nesmí být užíván v případě známé přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku. ACUTIL obsahuje alergenů ze sóji a ryb. ACUTIL neobsahuje lepek, sacharózu, mléčné a pšeničné složky, kvasnice a umělá barviva. Není určeno k podávání dětem. Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby vyznačené na obalu. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

## **BALENÍ**

Balení obsahuje 30 kapslí.

## **VÝROBCE**

Efamol Ltd. 14 The Mole Business Park Leatherhead, Surrey KT22 7BA, UK

## **Distributor v ČR**

Medicom International s.r.o. Páteřní 7 635 00 Brno, ČR [www.medicomint.cz](http://www.medicomint.cz)